

Annexe 1

Lignes directrices du groupe de travail sur la dépression de l'APC/CANMAT: Fréquence des effets secondaires des inhibiteurs sélectifs de recaptage de la sérotonine (ISRS) et des nouveaux antidépresseurs aux doses thérapeutiques recommandées

	Citalopram (Celexa®)	Fluoxétine (Prozac®)	Fluvoxamine (Luvox®)	Paroexetine (Paxil®)	Sertraline (Zoloft®)	Néfazodone (Serzone®)	Trazodone (Desyrel®)	Bupropion (Wellbutrin®)	Venlafaxine (Effexor®)	Mirtazapine (Remeron®)
Effets sur le SNC										
Somnolence, sédation	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++++	++	+++	++++
Insomnie	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	++
		(éviter dose en soirée)						(éviter dose en soirée)		
Agitation, hypomanie (p.ex. maladie bipolaire)	++	++	+++	++	+++	++	—*	+++*	+++*	++
Désorientation/confusion	+	+++	++	+	+	+++	+	++	++	++
Céphalées	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+++	++
Asthénie, fatigue	+++	+++	+++	+++	++	+++	+++	++	+++	+++
Effets anticholinergiques										
Sécheresse de la bouche	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++++
Vision embrouillée	++	++	++	++	++	+++	++	+++	++	+++
Constipation	++	++	+++	+++	++	+++	++	+++	+++	+++
Sudation	+++	++	+++	+++	++	++	—	+++	+++	++
Rétention urinaire (surtout les personnes âgées)	++	++	++	++	+	+	+	++	+	++
Effets extrapyramidaux										
Tremblement	+++	+++	+++	+++	+++	+	++	+++	++	++
Non spécifié	+	++	++	++	++	+	++	++	++	+
Dyskinésie tardive (rare)		R					R			
Effets cardiovasculaires										
Hypotension orthostatique/étourdissements	++	+++	++	+++	+++	+++	+++	++	+++	++
Tachycardie, palpitations	++	+	+	++	++	+	++	++	++	++
Diminution du rythme cardiaque	R	R	R	R	R	R				
Changements à l'ECG ^c	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+
Arrhythmie cardiaque	+	+	+	+	+	+	++	+	+	+
		(dysrhythmie auriculaire)					(ESV)			
Hypertension								R	R	
Malaise gastro-intestinal	+++	+++	++++	+++	++++	+++	+++	+++	++++	++
Dermatite, rash cutané?	+	++	++	+	++	+	+	++	++	+
Gain pondéral (plus 6 kg)	+	+	+	++	+	—	++	+	+	++++
Perte de poids au départ	R	R		R	R			R	R	
Dysfonction sexuelle	++	++++	++++	++++	++++	+	+	+	+++	+
Priapisme		R		R	R		R	R	R	
Convulsions (chez les non épileptiques)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
								(plus élevées aux doses 450mg/jour ou boulimie)		

Légende

+	<2%
++	\$2%
+++	\$10%
++++	\$30%
R	rapporté, sans autres détails

Adapté avec la permission de: Bezchlibnyk-Butler KZ, Jeffries JJ. Clinical Handbook of Psychotropic Drugs, 10th ed. Copyright 2000 by Hogrefe & Huber Publishers, Toronto *et de* Kennedy SH, Lam RW, Cohen NL, Ravindran AV, et du Groupe de travail sur la dépression CANMAT. Clinical Guidelines for the Treatment of Depressive Disorders. *Canadian Journal of Psychiatry* 2001;46(Suppl1):45S.

* Semble moins déclencher d'épisode de manie